

Imidazol-Derivate - Sileo (Hund)

Wichtige Informationen zum Einsatz von Dexmedetomidinhydrochlorid Sileo®, Tabletten beim Hund:

- Der Wirkstoff Dexmedetomidinhydrochlorid gehört zu der Gruppe der Imidazol-Derivate, die vor allem als ein Alpha - 2-Adrenorezeptor - Agonist in niedriger Dosierung anxiolytisch und in höhere Dosierung sedierend wirken. Es kommt zu einer Blockade von Noradrenalin und wirkt zentral, je nach Dosierung, anxiolytisch, sedierend oder analgesierend.
- Sileo ist zugelassen zur Linderung akuter Geräuschangst und / oder Geräuschfurcht bei Hunden.
- **In Praxis auch geeignet für: Optimierung des Trainings vor Beginn bei niedriger Frustrations- bzw. Erregungskontrolle - Gabe ca. 45-60 min vor Trainingsbeginn!!**
- Sileo ist als Gel auf die Maul-SH zwischen Lefze und Zahnfleisch in einer Dosierung von 125 Mikrogramm/ qm **bis zu 5x tgl. im Abstand von 2 Std. zu verabreichen.**
- Die **Wirkung** tritt **nach 10-60 min ein.**
- **Dosis: Siehe Tabelle**
- Bei Sileo sind folgende Nebenwirkungen möglich: blasse SH an Ort der Applikation, Sedierung, Erbrechen, Harninkontinenz.
- **CAVE! nicht anwenden bei: schweren HKS-Erkrankungen, Nieren- oder Lebererkrankungen, nicht nach vorangegangener Sedation, bei Überempfindlichkeiten**
- **CAVE!! Handschuhe tragen + Verschlucken des Gels verhindern - wirkt dann nicht !!!**

Dosis für Ihren Hund: Siehe Dosierungstabelle